

Psychoonkologische Belastungssituation von Patienten nach Nierenzellkarzinom-Therapie

Marc Heydenreich, Dirk-Henrik Zermann

Literatur

1. Erdmann F et al. Krebs in Deutschland für 2017/2018. (https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/9042/krebs_in_deutschland_2021.pdf%3Bjsessionid%3D3B7086E853920E599859A5232A68DFA9.pdf?sequence=1&isAllowed=y) Zugegriffen: 29.03.2022
2. Heydenreich A. Radikale retroperitoneale Nephrektomie. Aktuelle Urologie 2018; 7(03): 275–88
3. Fornara P et al. Laparoskopische vs. offene Nephrektomie. Der Urologe, Ausgabe A. 2003; 42(2): 197–204
4. Zermann D-H und Vahlensieck W. Rehabilitation beim Nierenzellkarzinom. In: Die Urologie: Springer 2016; 2195–7
5. Vahlensieck W et al. Sozialmedizinische Begutachtung nach operativer und zielgerichteter Therapie des Nierenzellkarzinoms. Der Urologe 2016; 55(12): 1601–4
6. Herschbach P et al. Revision und psychometrische Prüfung des Fragebogen zur Belastung von Krebskranken (FBK-R23). Zeitschrift für Medizinische Psychologie 2003; 12(2): 69–76